



Nr. 18501 / 11.11.2024

CATRE TOATE PRIMARIILE DIN JUDETUL TELEORMAN

Avand in vedere nota de serviciu nr. 27061/31.10.2024, prin care sunt precizate urmatoarele aspecte esențiale:

- La nivel european, au fost raportate focare de gripă aviară înalt patogenă în 30 de țări, afectând 283 de ferme de păsări domestice și 619 cazuri la păsările sălbatice; În ultimele două săptămâni, au fost înregistrate focare în 25 de exploatații comerciale din șapte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce a dus la sacrificarea a peste 1,5 milioane de păsări;
- În România, în această perioadă a fost înregistrat în județul Tulcea un focar la o exploatare non-comercială de păsări (20 galinacee și 27 palmipede);
- În această perioadă are loc migrația de toamnă a păsărilor sălbatice, palmipelele reprezentând rezervorul natural pentru virusul HPAI, ceea ce implică un risc crescut de răspândire a virusului pe teritoriul României;

Este necesară aplicarea de măsuri suplimentare de biosecuritate în gospodăriile populației, pentru a reduce riscul de contact între păsările domestice și cele sălbatice. Aceste măsuri includ:

- 1- Separarea speciilor: În măsura posibilităților, rațele și găștele vor fi separate de alte păsări domestice pentru a limita transmiterea virusului gripei aviare.
- 2- Creșterea păsărilor în spații închise: Păsările domestice vor fi crescute în spații special amenajate și închise. În cazurile în care acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea lor vor fi efectuate într-o zonă acoperită, inaccesibilă păsărilor sălbatice.
- 3- Interdicția utilizării apei de suprafață: Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă provenită din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice.
- 4- Limitarea accesului uman în zonele de creștere: Accesul în zonele de exploatare a păsărilor domestice va fi restricționat la o singură persoană responsabilă de îngrijirea animalelor, pentru a reduce riscul de introducere a virusului.
- 5- Prevenirea contactului cu alte animale: Se vor lua măsuri pentru a preveni contactul păsărilor domestice cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale de companie.





- 6- Dezinfectarea încălțămintei: Pentru a evita introducerea sau diseminarea virusului, se va utiliza încălțămintă dedicată în spațiile de creștere a păsărilor domestice, sau se va amenaja un spațiu pentru dezinfectarea încălțămintei.
- 7- Prevenirea contactului cu păsările sălbatice: Este esențial să se prevină contactul direct și indirect între păsările sălbatice și cele domestice. Se va limita accesul păsărilor domestice și al celor sălbatice captive la sursele de apă naturale sau artificiale, cum ar fi lacuri, bălți și râuri.

Deasemenea, în calitate de Unitate Locală de Sprijin, vă rugăm să asigurați toate facilitățile pentru a putea efectua activități de ecarisare a teritoriului în cazul evoluției unui focar de Gripa Aviara.

Atașăm prezentei adrese un poster destinat informării populației privind factorii de răspândire a virusului, simptomele și măsurile de combatere a acestuia.

Director Executiv
Dr. Ianculescu Iulian



Dr. Murga Bogdan	Director Adj	11.11.2024	
Dr. Chera Adrian	Sef S.C.O.S.B.A.	11.11.2024	
Dr. Rizea Daniela	Consilier S.C.O.S.B.A.	11.11.2024	



Gripă aviară (Influență aviară)

- boală virală extrem de contagioasă, care afectează în principal păsările, dar poate infecta și specii de mamifere-

Gripa aviară poate ucide efective întregi de păsări, cauzând pierderi devastatoare.

Factori care pot contribui la răspândirea virusului:

- păsările sălbatice și rutele de migrație;
- aglomerări de păsări sau piețele vii;
- comerțul necontrolat cu păsări vii;

Simptome clinice:

- decubit prelungit, stare letargică;
- inapetență, încetarea ouatului;
- respirație greoaie, tuse, febră;
- aripi zburlete, torticolis, paralizie;
- secreții din cioc și nări;
- creasta și bărbile umflate, de culoare roșu închis;



Crescătorii de păsări trebuie să respecte următoarele reguli:

- să anunțe medicul veterinar atunci când apar simptome de îmbolnăvire sau moarte la păsări sau animale;
- să își țină păsările închise în adăposturi pentru a reduce contactul cu alte păsări sălbatice;
- să limiteze accesul păsărilor domestice la luciuri de apă (bălți, lacuri, etc.);
- să acorde tot sprijinul medicilor veterinari și autorităților sanitar-veterinare și să respecte legislația în vigoare privind circulația și transportul păsărilor;
- să respecte normele de biosecuritate;